

QUIZZ DIABETE ET COVID


Dr Blandine DELENNE

Service de diabétologie, Centre Hospitalier du Pays d'Aix

Le COVID 19 peut être « attrapé » d'une personne qui n'a aucun symptôme ?



ou



Le COVID 19 peut être « attrapé » d'une personne qui n'a aucun symptôme ?

oui

Les personnes COVID + au test et qui n'ont pas de signes de COVID sont malheureusement contagieuses, c'est un des problèmes pour la propagation de la maladie et l'intérêt du dépistage en cas de « contact »...


Le COVID 19 est principalement
asymptomatique ?



ou



Le COVID 19 est principalement asymptomatique ?



Selon les études,
30 à 50 % des personnes positives au COVID 19 sont asymptomatiques
(sans aucun signe de COVID)


Se laver les mains est meilleur qu'utiliser
un désinfectant pour les mains ?



ou



Se laver les mains au savon est meilleur qu'utiliser un désinfectant pour les mains ?



non

Non, c'est quasiment équivalent !

Il faut surtout respecter dans les 2 cas une bonne technique de lavage.


Le gel hydroalcoolique est pratique à l'extérieur de chez soi...

A la maison, préférer le savon !


Le principal symptôme du COVID est
d'avoir « le nez bouché » ?



ou



Le principal symptôme du COVID est d'avoir « le nez bouché » ?



Les 3 principaux signes sont : la fièvre, la toux sèche, la fatigue

Mais il en existe en effet beaucoup d'autres comme :

le nez bouché, la perte du goût et /ou de l'odorat, mal de tête, douleurs musculaires, un essoufflement, une diarrhée...

L'incubation du COVID 19 est de 3 à 14 jours?



ou



L'incubation du COVID 19 est de 3 à 14 jours?


oui

La contagiosité est maximale 48 heures avant les signes cliniques et dans les jours qui suivent leur apparition

J'ai entendu que les corticoïdes étaient efficaces pour traiter le COVID, je dois toujours en avoir à la maison ?



ou



J'ai entendu que les corticoïdes étaient efficaces pour traiter le COVID, je dois toujours en avoir à la maison ?

non

Surtout pas !

Les corticoïdes se donnent dans les formes graves, à l'hôpital seulement. Ils peuvent bien sûr être prescrits chez les patients diabétiques, sous surveillance rapprochée des glycémies.

Je suis diabétique et j'ai le COVID, est-ce que je vais être obligatoirement hospitalisé ?

oui

ou

non

Je suis diabétique et j'ai le COVID, est-ce que je vais être obligatoirement hospitalisé ?

non

Non ! (et heureusement !)

Les patients diabétiques ont néanmoins un risque plus élevé de forme grave, surtout si âgés de plus de 65 ans et/ou obèses et/ou avec des complications du diabète.

Vous devez bien surveiller votre état clinique et rester en lien avec votre médecin.


Je prends des comprimés pour mon diabète, j'ai entendu dire que c'était dangereux avec le COVID ?



ou



Je prends des comprimés pour mon diabète, j'ai entendu dire que c'était dangereux avec le COVID ?



Aucun traitement du diabète n'est dangereux avec le COVID 19, ils sont tous à poursuivre pour obtenir le meilleur équilibre possible.

Je suis diabétique et vient d'être hospitalisé pour une forme grave de COVID, j'ai plus d'une chance sur 2 d'être à la maison dans 28 jours ?

oui

ou

non

Je suis diabétique et hospitalisé pour une forme grave de COVID, j'ai plus d'une chance sur 2 d'être à la maison à 28 jours ?

oui

L'étude française CORONADO montre en effet que plus d'1 patient diabétique sur 2 hospitalisé pour forme grave de COVID est chez lui 28 jours après son admission 

MERCI D'AVOIR JOUE !!!

